

# Liebig-Dispenser



- ✓ Sehr gut geeignet für Magazinbeuten.
- ✓ Einfache Dosierung dank variablem Dochtpapier.
- ✓ Einfachste Befüllung und Kontrolle durch gut sichtbarer Skala.

# Liebig-Dispenser

## Verdunster für FORMIVAR® 60%



Anwendungszeitpunkt

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



### 1. Einstellen

Dochtpapier auf die Grundplatte legen. Muss je nach Tagestemperatur und Beutesystem angepasst werden.



### 2. Einfüllen

Tropfeinsatz entfernen und die Flasche mit der nötigen Dosierung auffüllen. Anschliessend Tropfeinsatz wieder aufstecken.



### 3. Aufsetzen

Flasche auf die Grundplatte mit Dochtpapier aufsetzen. Durch den Tropfeinsatz läuft die Ameisensäure auf das Dochtpapier.

### Anwendung

Erste Behandlung Mitte/Ende Juli für 3–5 Tage, nach der Honigernte. Im Anschluss das Volk auffüttern. Zweite Behandlung im September für 6–14 Tage.

### Dosierung

Je nach Beutesystem pro Anwendung 50–200 ml FORMIVAR® 60%

### Sicherer Umgang mit Säuren

Schützen Sie sich mit geeigneter Schutzausrüstung.